



Para prevenir las INTOXICACIONES DOMÉSTICAS, es importante:

NO dejar medicamentos y los productos peligrosos al alcance de los niños.

NO extraerlos de su envase original para que puedan ser identificados con facilidad los productos causantes de la intoxicación.

Siempre que se pueda, se deben escoger envases con sistemas de apertura de seguridad a prueba de niños.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

- ✓ **Manchas extrañas** en la piel o en la ropa, olor anormal en el aliento.
- ✓ **Cambios súbitos de comportamiento** como somnolencia, dolor de estómago, miedo, hiperactividad o irritabilidad sin motivo aparente.
- ✓ Aparición de **náuseas y vómitos**.
- ✓ **Envases de medicamentos o productos peligrosos abiertos** y parcial o totalmente vacíos.



¿Qué debe hacerse ante una SOSPECHA DE INTOXICACIÓN?

Llamar o acudir al médico o a un servicio de urgencias (guardia) lo más rápido posible.

Si la intoxicación se produjo por ingestión, **no intentar provocar el vómito ni administrar líquidos** (leche) sin instrucciones directas del médico.

Si el tóxico entró en contacto con los ojos, **no aplicar colirios o pomadas**. Lavarlos inmediatamente con **agua corriente** durante unos minutos (10-15 minutos), manteniendo los párpados abiertos para arrastrar el producto.

Si el tóxico entró en contacto con la piel o las mucosas, **lavar inmediatamente la zona con agua corriente** abundante durante unos minutos (10-20 minutos) para intentar arrastrar el agente causal.

Intentar **encontrar el producto sospechoso de la intoxicación y guardarlo en el recipiente original**.

Llevar el producto al servicio de urgencias e intentar determinar la cantidad ingerida. Si el paciente vomita, debemos **guardar el material vomitado** ya que puede ayudar a identificar el agente causal.

