

Enfermedades Infectocontagiosas

Coqueluche

La Coqueluche o Tos Convulsa es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*. Se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias de las personas enfermas. Puede ser grave en bebés menores de seis meses y niños pequeños.

Alcanzar las metas de vacunación es clave para proteger a toda la comunidad.



¿Sabías que ...

El contagio de esta enfermedad puede producirse por aulas mal ventiladas, superpoblación y hacinamiento, falta de lavado frecuente de manos (con agua y jabón) y falta de higiene de los ambientes y superficies utilizadas en espacios de trabajo compartidos.

¿Cómo se presenta la enfermedad?

Durante las primeras dos semanas (fase catarral), se presenta como un resfriado con tos y, en pocas ocasiones, fiebre. En bebés pequeños puede afectar la alimentación. Luego comienza la fase paroxística, que puede durar hasta seis semanas, con accesos violentos de tos repetidos (en salva), seguidos de una inspiración ruidosa (estridor) y, a veces, vómitos. En adultos puede presentarse como una tos persistente durante varias semanas. En bebés, puede causar pausas respiratorias (apneas) y coloración azulada

Acercate a tu Seccional
para recibir información
y asesoramiento sobre
los pasos a seguir.

Suteba

CTERA

ETA
Comisión de Trabajo y Condiciones de la Argentina

de la piel (cianosis) por falta de oxígeno. Después de 2 a 3 semanas, la tos disminuye gradualmente. Cuando la enfermedad se complica, puede ser potencialmente mortal.

Cuando el Equipo de Salud identifica un caso sospechoso, indica el tratamiento correspondiente y lo notifica al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Además del tratamiento, se indican medidas para evitar su propagación.

Los antibióticos administrados tempranamente mejoran la evolución de la enfermedad y ayudan a evitar su propagación entre los contactos. Deben ser indicados por el Equipo de Salud según la edad y el cuadro clínico de cada persona.

Ante la aparición de síntomas, es importante consultar con el Equipo de Salud o con un/a profesional médicx.

¿Puede prevenirse?

Se previene con las vacunas incluidas en el Calendario Nacional:

- **Lactantes:** tres dosis a los 2, 4 y 6 meses.
- **Primer refuerzo:** a los 18 meses (quíntuple).
- **Segundo refuerzo:** al ingreso escolar (triple bacteriana celular).
- **Adolescentes:** a los 11 años (triple bacteriana celular).
- **Personas gestantes:** una dosis de vacuna triple bacteriana acelular en cada embarazo, después de la semana 20 de gestación.
- **Personal de salud:** una dosis de vacuna triple bacteriana acelular cada 5 años si atienden a menores de 12 meses.

La prevención ante un caso confirmado incluye la profilaxis antibiótica entre los contactos directos, incluso si ya están vacunadx.

Para evitar el contagio, es importante:

- ✓ **Aislamiento del caso sospechoso hasta completar 5 días de tratamiento antibiótico. En caso de no recibir antibiótico, debe aislarse por 21 días desde el inicio de la tos.**
- ✓ **Tratamiento antibiótico (indicado por el equipo de salud).**
- ✓ **Notificación al Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS).**
- ✓ **Investigación de contactos y fuentes de infección para dar las indicaciones de aislamiento, profilaxis antibiótica y/o inmunizaciones que sean necesarias.**
- ✓ **Quimioprofilaxis antibiótica de contactos familiares o cercanxs, cualquiera sea la edad o el estado inmunitario.**
- ✓ **Vacunación con una dosis de vacuna triple bacteriana celular a los contactos cercanos menores de 7 años que no hayan recibido 4 dosis, ni una dosis en los últimos 3 años. Una dosis de vacuna triple bacteriana acelular a mayores de 7 años hasta los 11 años.**

El derecho a la Salud: una construcción colectiva de lxs Trabajadorxs

Secretaría
de Salud Laboral

 SUTEBAPrestaciones

www.suteba.org.ar

