


Enfermedades Infectocontagiosas

Rec. 2-2019 CJM

Escabiosis

La escabiosis o sarna humana es una enfermedad de la piel causada por un ácaro que penetra debajo de la piel y deposita sus huevos. Puede afectar a personas de todas las edades y clases sociales. El hacinamiento y las dificultades para lograr un correcto lavado y secado de la ropa personal y de cama hacen más susceptibles a las personas.



¿Sabías
que ...

La escabiosis es una enfermedad curable. El tratamiento debe ser gratuito y es importante abordarlo en forma conjunta entre las instituciones educativas, de salud y con la familia.

La enfermedad en lxs Docentes debe ser denunciada como Enfermedad Profesional ante la ART, siempre y cuando se hayan detectado casos en la Escuela y se registre documentación que lo certifique.

Acercate a tu Seccional para recibir información y asesoramiento sobre los pasos a seguir.

Suteba 

CTERA

CTA
Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

¿Cómo se transmite?

Es muy contagiosa, especialmente en el grupo familiar/conviniente. El ámbito escolar no provee en general el grado de contacto necesario para su transmisión, pero se debe tener en cuenta cuando hay muchxs infectadxs porque puede producirse el contagio. El ácaro puede sobrevivir hasta 3 días en la ropa y transmitir la enfermedad, aunque el principal medio de contagio es el contacto directo de piel a piel con una persona infectada. Los animales no propagan la sarna humana: las mascotas tienen un tipo diferente de infección denominada sarna animal.

¿Cuáles son los síntomas?

El síntoma principal es la picazón, que comienza entre 2 y 3 semanas luego de la infestación y es más fuerte durante la noche. También aparecen lesiones en la piel que parecen picaduras, ampollas o granitos y líneas rojas, que señalan que el ácaro ha penetrado debajo de la piel. En lxs niñxs pequeñxs, las lesiones pueden presentarse en la cabeza, el cuello, los hombros, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

En lxs niñxs mayores y en lxs adultxs, la infección puede estar entre los dedos, las muñecas, el abdomen, axilas, glúteos, genitales y los codos. Por el rascado se puede producir una complicación frecuente, la infección bacteriana de las heridas (impétigo).

¿Cómo se trata?

El tratamiento de la escabiosis es corto y efectivo. Puede ser tópico (con lociones de permetrina) o de forma oral (ivermectina) y siempre supervisado por Médicxs. El tratamiento debe realizarse en todo el grupo de convivientes simultáneamente para evitar que se repita el contagio. Además, se debe lavar la ropa interior, las toallas y los pijamas con agua caliente. Aquella ropa que no pueda ser lavada y secada al sol, debe ser colocada en una bolsa plástica cerrada por un período de 2 semanas.

Es muy importante mantener la loción médica fuera del alcance de lxs niñxs ya que es tóxica si se ingiere. La picazón puede continuar por dos semanas o más después de iniciado el tratamiento, luego desaparece si se siguieron las indicaciones médicas correctamente.

Fuente: Equipo de Salud del SUTEBA.
2º edición - agosto de 2025.

El derecho a la Salud: una construcción colectiva de lxs Trabajadorxs

Secretaría
de Salud Laboral

 SUTEBAPrestaciones

www.suteba.org.ar

